

Coryzalia®, liquido orale in recipiente unidose

Medicamento omeopatico

Quando si usa Coryzalia?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Coryzalia può essere usato in caso di raffreddore.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chiedi al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Coryzalia.

Quando non si può assumere Coryzalia e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non somministrare Coryzalia ai bambini di meno di 6 mesi di età. Nei bambini da 6 a 23 mesi, usare il medicamento solo dopo consulto medico.

Coryzalia non deve essere usato se lei o il suo bambino soffrite di ipersensibilità al cromo o se siete allergici a una delle sostanze attive o agli altri componenti contenuti nel medicamento.

Consultare un medico nel caso in cui i sintomi persistano oltre 7 giorni o si aggravino oppure in caso di apparizione dei seguenti sintomi, in particolar modo nei bambini di meno di 2 anni di età:

- febbre alta (superiore a 38,5 °C),
- difficoltà a respirare,
- dolori o suppurazione dell'orecchio,
- secrezioni purulente dagli occhi,
- gonfiore della palpebra,
- disturbi digestivi (difficoltà di alimentazione, vomito, diarrea).

Non somministrare nel naso, negli occhi o nelle orecchie.

Non iniettare.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- lei o il suo bambino soffrite di altre malattie
- lei o il suo bambino soffrite di allergie
- lei o il suo bambino assumete altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) in uso interno o esterno.

Si può assumere Coryzalia durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Coryzalia?

Non somministrare ai bambini di meno di 6 mesi di età. Nei bambini da 6 a 23 mesi, usare il medicamento solo dopo consulto medico.

Salvo diversa prescrizione medica:

Adulti e bambini a partire dai 6 mesi di età: 1 recipiente unidose, da 3 a 6 volte al giorno, per via orale. Non oltrepassare 6 unidosi al giorno.

Distanziare le somministrazioni in caso di miglioramento e interromperle alla scomparsa dei sintomi.

La durata del trattamento non deve oltrepassare una settimana.

Lavarsi le mani prima di usare il medicamento. Per somministrare Coryzalia:

1. Aprire la bustina di alluminio.
2. Staccare un recipiente unidose dalla barretta.
3. Aprirlo facendo girare la punta.
4. Versare il contenuto dell'unidose in bocca, premendo leggermente il recipiente.
Nel bambino, la somministrazione deve avvenire con il bambino in posizione seduta.
5. Richiudere accuratamente la bustina contenente le altre unidosi ripiegando il lato aperto.

Al fine di somministrare una soluzione sempre sterile, usare una nuova unidose ad ogni utilizzo.

Non conservare un'unidose dopo l'apertura. L'unidose deve essere gettata dopo ogni uso.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Coryzalia?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Coryzalia e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Coryzalia.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo l'apertura della bustina: conservare i recipienti unidosi non utilizzati nella bustina chiusa e usarli entro 3 mesi.

Dopo l'apertura di un recipiente unidose:

- Il prodotto deve essere usato immediatamente.
- Gettare l'unidose dopo l'uso/apertura.
- Non conservarla per un utilizzo ulteriore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Cosa contiene Coryzalia?

Un recipiente unidose da 1 ml di liquido orale contiene

Principi attivi

Allium cepa (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.166 ml

Belladonna (Ph.Eur.Hom.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.166 ml

Gelsemium (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.166 ml

Kalium bichromicum (Ph.Eur.Hom.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 3.1.3) 0.166 ml

Pulsatilla (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.166 ml

Sabadilla (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.166 ml

Sostanze ausiliarie

Acqua purificata

Numero dell'omologazione

68347 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Coryzalia? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 10, 15, 20 o 30 recipienti unidose da 1 ml.

Titolare dell'omologazione

BOIRON SA – CH-1754 Avry-sur-Matran

Fabbricante

BOIRON SA – Francia

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

31955 / 30.06.2025